

Basatop® Sport 20+5+10(+3+5)

Stickstoffbetonter Volldünger, teilweise umhüllt, mit kontrollierter Nährstoffabgabe für Sportplätze, Golf-Fairways, Gebrauchsrasen sowie Zier- und Neuanlagen.

Packungsinhalt und -art
25-kg-Kunststoffsack

Palettenbestückung
40 Sack = 1.000 kg

NPK-Dünger N+P₂O₅+K₂O(+MgO+S) 20+5+10(+3+5) mit Magnesium, Schwefel sowie Bor, Eisen und Zink.

EG-DÜNGEMITTEL

Für die Anwendung im Gartenbau. chloridarm

20 %	N	Gesamt-Stickstoff 9,5 % N Nitratstickstoff 10,5 % N Ammoniumstickstoff
5 %	P ₂ O ₅	neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 2,5 % P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat
10 %	K ₂ O	wasserlösliches Kaliumoxid
3 %	MgO	Gesamt-Magnesiumoxid 2,4 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
5 %	S	Gesamt-Schwefel 4 % S wasserlöslicher Schwefel
0,02 %	B	Gesamt-Bor 0,02 % B wasserlösliches Bor
0,3 %	Fe	Gesamt-Eisen
0,02 %	Zn	Gesamt-Zink

40 % des Produktes sind umhüllt mit Poligen als Hüllsubstanz, was zu einer gleichmäßigen, schrittweisen Freisetzung der Nährstoffe sowie des leicht auswaschbaren Stickstoffs führt.

Gefahrstoffverordnung

Düngemittel mit Ammoniumnitrat, Gruppe B I

Technisch-physikalische Daten

Schüttgewicht: ca. 1.100 kg/m³

Kornart: Granulat

Korngröße: 90 Gew.-% 2,0–4,0 mm

Farbe: Mischung aus blauen und braunen Granalien

Wirkung

Die Nährstoff-Freisetzung von Basatop® Sport erfolgt in zwei Stufen. Nach dem Streuen und unter Einwirkung von Feuchtigkeit beginnt die Startwirkung, so dass die Pflanzen sofort mit allen Nährstoffen versorgt werden. Der in der Regel hohe Anfangsbedarf wird damit voll gedeckt. Danach beginnt die Langzeitwirkung aus den umhüllten Körnern zur Deckung des Nährstoff-Folgebedarfs. Die Nährstoffe durchdringen die Hülle kontinuierlich in Abhängigkeit von Feuchtigkeit und Temperatur. Unter normalen Witterungsbedingungen hält der Nährstofffluss 2–3 Monate an. Bei niedrigen Temperaturen (unter 10 °C) hört die Nährstoff-Nachlieferung auf. Auch Trockenheit unterbindet die Nährstoff-Freisetzung, so dass die Versorgung der Pflanzen im Einklang mit den biologischen Wachstumsfaktoren stattfindet. Basatop® Sport hat ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis und ist breit einsetzbar im Öffentlichen Grün/Landschaftsbau, Golfbereich und Gartenbau.

Anwendung

Basatop® Sport kann sowohl von Hand als auch mit Streugeräten sehr gut ausgebracht werden. Die Nährstoffverteilung ist sehr gleichmäßig, da in jedem Korn alle Nährstoffe enthalten sind. Der Einsatz erfolgt zur Grund- und Pflegedüngung. Bei den empfohlenen Aufwandmengen besteht, wenn auf trockene Kulturen gedüngt wird, keine Verbrennungsgefahr. Eine Bereg-

nung nach der Anwendung fördert die Sofortwirkung. Bei empfindlichen Pflanzen, z. B. im Gartenbau, sollte darauf geachtet werden, dass keine Körner auf den Blättern liegenbleiben. Basatop® Sport kann ganzjährig ausgebracht werden. Es ist im Kultur- und Jahresverlauf gut kombinierbar mit den Floranid®^{Twin}-Langzeitdüngern, besonders dem Floranid®^{Twin} Permanent, sowie weiteren Langzeitdüngern aus dem Basatop®-Sortiment.

Anwendungsempfehlung Öffentliches Grün, Golfbereich, Garten- und Landschaftsbau sowie Erwerbsgartenbau

Anwendungsbereiche	Streuenge g/m ² je Gabe	Streuenge kg/100 m ² je Gabe	Anwendungszeitraum	Anzahl der Gaben pro Jahr
Rasen				
- Golf-Fairways	20-30	2,0-3,0	März-August	1-2
- Rasensportplätze	20-35	2,0-3,5	März-August	1-3
- öffentl. Grünflächen	20-30	2,0-3,0	März-August	1-2
- Liegewiesen, Spielrasen	20-30	2,0-3,0	April-Mai	1
- Rasenansaat	30-40	3,0-4,0	Bei der Ansaat	1
Zieranlagen				
- Einjahresblumen	20-35	2,0-3,5	Pflanzung/Nachdüngung	1-2
- Stauden	20-30	2,0-3,0	Pflanzung/Nachdüngung	1-2
- Rosen, Ziersträucher	30-40	3,0-4,0	Pflanzung/Nachdüngung	1-2
Gehölze				
- Pflanzungen (Neuanlagen)	30-40	3,0-4,0	Zur Pflanzung	1
- Nachdüngung Gehölze, Zieranlagen	20-30	2,0-3,0	April-Juni	1
Dachgarten				
- Nachdüngung	15-25	1,5-2,5	April-Juni	1
Baumschulkulturen				
- Anzucht (Flächendüngung)	20-30	2,0-3,0	Bei Bedarf	1-2
- Quartiere	20-40	2,0-4,0	Bei Bedarf	1
Gemüsebau				
- unter Flachfolie	40-70	4,0-7,0	Zur Pflanzung	1-2
- Gewächshaus	40-70	4,0-7,0	Bei Bedarf	1-3
Schnittblumen	40-70	4,0-7,0	Bei Bedarf	1-3